



## 2. 栽培管理

○不定芽新梢が込み合っている部位については、間引きを行いましょ。

【不要な新梢（下芽、不定芽、予備枝など）のせん除】

→ 不要な養分の浪費を防ぎ、薬液の通りも良くなります。



○適正施肥の実施 → 密植園や窒素多肥では発病しやすくなります。

着果量不足の園地・・・追肥禁止！

## 3. 薬剤散布

薬剤散布は降雨前に実施し、散布ムラのないよう十分な量を心掛けましょ。また、新梢整理を実施し、かかりやすい状態にしてください。

### 【なし防除情報 6月号】※赤・青ナシ共通

散布回数	散布時期	対象病害虫	薬剤の種類及び濃度(水100ℓ当り)	SS 散布量
特別散布	6月上旬頃	ニセナシサビダニ ナミハダニ	1. 展着剤 2. コテツフロアブル 2,000倍 (50cc)	300ℓ
9	6/8頃	輪紋病 黒星病 カイガラムシ類	1. 展着剤 2. ナリアWDG 2,000倍 (50g) 3. アプロードフロアブル 1,000倍 (100cc) 1. 今回以降ナシマルカイガラムシ(サンホーゼカイガラムシ)の発生に注意する。 2. ナリアWDGは、ピオーネ、ル・レクチェに薬害を生ずるおそれがあるので注意して散布する。	300ℓ
特別散布	6/15頃	黒星病	1. 展着剤 2. オキシラン水和剤 500倍 (200g)	300ℓ
10	6/22頃	輪紋病・黒星病 シンクイムシ類・アブラムシ類 カイガラムシ類	1. 展着剤 2. ベルクート水和剤 1,000倍 (100g) 3. スプラサイド水和剤 1,500倍 (65g) 1. ベルクート水和剤は、ル・レクチェにさび果を生じるので、かからないよう注意する。 2. オウトウ、モモの隣接園では、かからないよう注意する。	300ℓ
11	6/29頃	黒星病・輪紋病 シンクイムシ類 カイガラムシ類	1. カナメフロアブル 4,000倍 (25cc) 2. オーソサイド水和剤 600倍 (165g) 3. スプラサイド水和剤 1,500倍 (65g) 1. 薬剤の使用回数に注意する。 2. オウトウ、モモの隣接園では、かからないよう注意する。	300ℓ

【住宅に隣接している園での散布時間帯については、早朝5時以降開始にご協力ください。  
また、通勤や通学の時間帯も避けてください。】

★今後の梅雨時期による感染拡大が懸念されます。そのため、**6月の散布は7日間隔**でご案内をさせていただきます。

※薬剤散布は使用回数に十分ご注意ください。

※ご不明な点は、各地区指導員へお問い合わせ下さい。

【発信部署：福島地区営農経済課】