

# 福島地区本部 【りんご 防除情報 9月号】

ふ未福営発第446号  
令和3年8月27日

標記の件につきまして、9月のりんご防除情報を下記の内容にてお知らせいたします。今後の天候に十分注意し予防散布を徹底してください。なお、収穫中の園地と隣接する園地では、十分に注意して散布してください。

## 【りんご】(防除暦 56～57頁参照)

散布回数	防除時期	対象病害虫	薬剤名及び使用倍数(水100%当り)		SS散布量
	※炭そ病等の被害果は二次感染の原因となるので、見つけしだい摘除し適切に処分する。				
14	9/8頃	炭そ病・斑点落葉病・輪紋病 褐斑病・すす点・すす斑病 (シンクイムシ類・キンモンホソガ)	1. 展着剤 2. オースサイド水和剤 ※隣接園に注意して散布する。	600倍	(165g) 500ℓ
	※1. 褐斑病が見られる場合や発生が懸念される園では、『ユニックス顆粒水和剤 2,000倍(50g)(収穫前14日)』も使用する。ただし、ユニックス顆粒水和剤は収穫前14日の規制があるので注意して使用する。 ※2. シンクイムシ類・キンモンホソガの発生が見られる場合は、『フェニックスフロアブル 4,000倍(25cc)(収穫前日)』も使用する。				
追加散布	9/18頃	炭そ病・斑点落葉病・輪紋病 褐斑病・すす点・すす斑病 【病害対策】	1. 展着剤 2. オースサイド水和剤 ※隣接園に注意して散布する。	600倍	(165g) 500ℓ
	※早生ふじやシナノスイートなど収穫が迫っている品種には、ベルコート水和剤1,000倍(100g)を使用しても構いません。ただし、炭そ病に効果はないのでご注意ください。				

【注意】オースサイド水和剤はキャプタン剤で年6回までの使用回数になります。キャプタン剤はオースサイド水和剤・オキシラン水和剤・ダイパワー水和剤になるので、年間使用回数にご注意ください。また、ベルコート水和剤はイミノクタジン剤で年3回までの使用回数になります。イミノクタジン剤はベルコート水和剤・ダイパワー水和剤になるので、年間使用回数にご注意ください。

～りんご落果防止剤の使用時期～

陽光・王林・こうとく……………9月20日頃

★「こうとく」にヒオモン水溶剤を使用する場合は、9月20日頃に1,500倍(65g)で使用してください。(防除暦65頁参照)

ストッポール液剤 1,500倍(65cc) 収穫前使用日数 7日前まで  
※収穫開始予定日の25日前～7日前に1回散布すること。  
※展着剤は使用しない。他の薬剤と使用しない。

ご不明な点がございましたら各地区指導員へお問い合わせください。